

膵臓がん

レジメン名	薬剤名	用量	投与日	1コース	時間(hr)
FOLFIRINOX	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²	Day1	14日	
	イリノテカン	180mg/m ²	Day1		
	オキサリプラチン	85mg/m ²	Day1		
	フルオロウラシル(急速)	400mg/m ²	Day1		
	フルオロウラシル(持続)	2400mg/m ²	Day1(46時間)		
mFOLFIRINOX	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²	Day1	14日	
	イリノテカン	150mg/m ²	Day1		
	オキサリプラチン	85mg/m ²	Day1		
	フルオロウラシル(持続)	2400mg/m ²	Day1(46時間)		
GEM単剤	ゲムシタビン	1000mg/m ²	Day1.8.15	28日	
nab-PTX+GEM	アルブミン懸濁型パクリタキセル	125mg/m ²	Day1.8.15	28日	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	Day1.8.15		
S-1+GEM	テガフル・ギメラシル・オテラシル	40mg/m ² /回	Day1-14	21日	術前療法は2コース
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	Day1.8		
nal-IRI + 5-FU/LV	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²	Day1	14日	
	リボソーム封入イリノテカン	70mg/m ²	Day1		
	フルオロウラシル(持続)	2400mg/m ²	Day1(46時間)		

2025年7月